

CONSIDERACIONES RESPECTO A LA VACUNACIÓN ANTIMENINGOCÓCICA EN ANDALUCÍA 2021

(Fecha de actualización: 03/06/2021)

La situación sanitaria provocada por la pandemia por COVID-19 ha modificado la incidencia de diversas enfermedades infecciosas, probablemente como consecuencia del establecimiento de las medidas de distanciamiento social y el aumento de medidas higiénico-sanitarias. Por otra parte, desde el inicio de la pandemia, tanto las autoridades sanitarias como las sociedades científicas se han mostrado preocupadas por el descenso de la tasa de vacunaciones durante este periodo y su posible repercusión sobre la inmunización de grupo una vez que se reduzca la aplicación de dichas medidas, ocasionando la emergencia de otras epidemias.

La enfermedad meningocócica ha sido una de las enfermedades prevenibles que más ha visto afectada su epidemiología. La importancia de mantener activa la prevención de esta enfermedad, que se refleja, entre otras acciones, en la estrategia “Zero Meningitis”: (<https://www.andavac.es/campanas/meningitis/>) desarrollada por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, nos impulsa a hacer público nuestra posición en este sentido.

Por una parte, en relación con la vacunación frente al meningococo B, de acuerdo con otras sociedades científicas, seguimos considerando necesaria su inclusión en el calendario vacunal en el primer año de vida, independientemente de la disminución de casos en el último año.

Con relación a la vacunación frente a los serogrupos ACWY del meningococo, ésta ha sido establecida en el territorio nacional por el consejo interterritorial de salud a los 12 años. En Andalucía se incluye, además, una dosis de ACWY a los 12 meses, siendo, junto a la Comunidad de Castilla y León, las únicas comunidades en las que se aplica esta estrategia. Se establece además un rescate en distintas cohortes para mejorar las tasas de vacunación en la adolescencia ([Instrucción DGSPYOF-1/2020 - Vacunación Antimeningocócica Andalucía](#)).

Junto a ello, las recomendaciones de protección individual frente a esta enfermedad pueden contribuir a aumentar la cobertura tanto del sujeto como del grupo, mientras se alcanzan tasas adecuadas según las estrategias de salud pública.

Considerando la epidemiología de la enfermedad meningocócica, independientemente del número de casos que se registren en un punto temporal, las características fisiopatológicas de la enfermedad y los mecanismos de transmisión sugieren habitualmente dos grupos

expuestos con los máximos picos de incidencia: a) Los menores de 5 años (especialmente los menores de 1 año de edad) y b) los adolescentes.

En el caso del meningococo B, recomendación orientada a la protección individual en función de la edad, adaptando los intervalos a lo establecido en la ficha técnica. Se cuenta con evidencia que soporta la eficacia de la vacunación para garantizar la protección directa del lactante (grupo de máxima prioridad) y en el adolescente.

En el caso de ACWY, recomendación individual de vacunación por debajo del año, teniendo en cuenta la posibilidad de sustituir la dosis frente al serogrupo C a los 4 meses por ACWY para ampliar la protección frente a otros serogrupos epidemiológicamente relevantes y emergentes en nuestro país como en otros países europeos desde temprana edad. En este caso, se hace extensivo lo manifestado por el Comité Asesor de Vacunas de la AEP, considerando que, al darse cobertura a la vacunación frente a meningococo C, no se incumple el calendario vacunal, siendo avalada por “*lex artis*”.

De acuerdo con lo indicado en ficha técnica, en menores de un año es válido un esquema 2+1, por lo que en este caso es necesario iniciar la vacunación a los 2 meses de edad, pudiéndose realizar la coadministración con el resto de las vacunas del calendario.

En cualquier caso, todas las vacunas administradas por recomendación individual deben ser correctamente registradas.

*Grupo Andaluz de Inmunología e Inmunopatología Pediátrica
Sociedad de Pediatría de Andalucía Occidental y Extremadura
Sociedad de Pediatría de Andalucía Oriental
Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria
Asociación Andaluza de Enfermería Comunitaria*